



Analyses a conditions particulieres de prelevement

Version 5

Date d'application :
2017-08-11

Page 1 sur 2

	Analyses à jeun strict de 12h	Analyses de préférence à jeun *	Analyses à faire à distance d'un repas = min 2h	Analyses soumises à un rythme circadien
Acide biliaire	OUI			le matin avant 10h
Acide urique			OUI	
ACTH	OUI			le matin avant 10h
Agglutinines froides		OUI		
Apolipoprotéines A et B	OUI			
Bilirubine			OUI	
C3	OUI			
C4	OUI			
Calcitonine	OUI			
Calcium, Calcium corrigé	OUI			
Cholestérol total, HDL et LDL	OUI			
CLA Pneumallergènes, Trophallergènes et Mixte		OUI		
Cortisol	OUI			le matin avant 10h
Créatinine et clairance			OUI	
CTX (Cross laps)	OUI			avant 9h et toujours à la même heure
Cryoglobuline	OUI			
DHEA				le matin avant 10h
Électrophorèse des protéines		OUI		
Fer sérique	OUI			le matin avant 10h
Fibrinogène			OUI	
FSH				le matin avant 10h de préférence ²
Gastrine	OUI			
Glycémie, Hyperglycémie provoquée (HGPO), test de O'Sullivan	OUI			
Glycosurie		OUI		
Helikit (test à l'urée)	OUI			
Homocystéine	OUI			
LH				le matin avant 10h de préférence ²
Peptide C	OUI			
Insuline	OUI			
Ostéocalcine	OUI			
Peptide C	OUI			
Phosphatase alcaline			OUI	
Phosphore	OUI			le matin avant 10h
Prolactine	OUI			entre 8h et 10h après 20 min au repos
PTH	OUI			
Rénine				Préciser debout ou couché : prélèvement debout après 1h de déambulation, prélèvement couché après au moins 1h de décubitus - Prélèvement environ 2h après lever du patient (qu'il ait marché ou non)
SDHEA				le matin avant 10h
Testostérone	OUI			le matin avant 10h de préférence ²
Transferrine	OUI			
Transaminases			OUI	
Triglycérides	OUI			
Urée			OUI	
Vitamine B9 sérique		OUI ¹		
Vitamine D		OUI		