

	FORMULAIRE	C2-F19
	Fiche de renseignements	Version 3
	cliniques : prelevement mycologique peau et phaneres	Date d'application : 2016-01-29 Page 1 sur 1

Chaque lésion différente par son siège ou son aspect clinique sera prélevée individuellement, en changeant d'instrument à chaque fois. Le matériel utilisé doit être stérile. Prélever suffisamment de matériel pour réaliser l'examen direct et la culture. Mettre des gants pour le prélèvement.

① Acheminer au laboratoire à température ambiante dans les 24H pour les ESWAB, 72h pour les boîtes de pétri.

Cutané

Lésions sèches : nettoyer la lésion avec de l'alcool 70°C et laisser sécher.

Gratter la lésion squameuse ou squamo-croûteuse en périphérie de la lésion à l'aide d'une curette de Brocq. Recueillir le produit de grattage dans une boîte de Petri stérile. Si le prélèvement siège au niveau d'une zone pileuse, il est indispensable de prélever des poils

Lésions inflammatoires, purulentes : écouillonner les suppurations dans un milieu eSwab

Lésions vésiculeuses : percer les vésicules à l'aide d'une aiguille fine, écouillonner la sérosité

Pyriasis versicolor : recherche de *Malassezia sp* : prélever des squames dans une boîte de Petri stérile et si la lésion n'est pas pileuse, apposer un morceau de scotch transparent sur la lésion et appliquer le scotch sur une lame porte-objet.

Désinfecter la zone prélevée

Ongles

Nettoyer l'ongle avec de l'alcool à 70°, de manière à éliminer les contaminants et laisser sécher. Couper toute la partie de l'ongle atteint avec la pince et/ou les ciseaux jusqu'à la limite de l'ongle sain et l'éliminer puis gratter au cœur de la lésion avec la curette de Brocq. En cas d'onychomycoses superficielles, racler les îlots blanchâtres à la surface de l'ongle (leuconychies) à l'aide d'une curette de Brocq. Récolter les divers prélèvements dans une boîte de Petri stérile

En cas de périonyxis associé à l'onyxis, appuyer sur la lésion pour faire sourdre une goutte de pus et prélever le pus avec un écouvillon eSwab, écrire sur l'étiquette d'identification « périonyxis ». Désinfecter la zone prélevée

Cuir chevelu et barbe

Si lampe de Wood, arracher les cheveux ou poils fluorescents et préciser le type de fluorescence, sinon prélever plutôt les cheveux cassés avec la racine (une dizaine) à la périphérie de la lésion. Les poils ou cheveux parasités n'offrent aucune résistance, il est inutile d'insister sur un poil ou cheveu ne venant pas spontanément. Gratter les squames et/ou croûtes à la périphérie de la lésion à l'aide d'une curette de Brocq. Récolter les divers prélèvements dans une boîte de Petri stérile. Si les lésions sont suppurées, prélever le pus avec un écouvillon eSwab. Désinfecter la zone prélevée.

Cadre réservé au laboratoire ○ Anomalie

Réceptionné par : Le à h

Identifier les échantillons, renseigner impérativement la fiche de renseignements ci-dessous et joindre l'ordonnance

Ne pas effectuer le prélèvement en cas de traitement antifongique datant :
- de moins de 3 mois si traitement systémique ou vernis
- de moins de 15 jours si application cutanée

Nom : Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance : __ / __ / ____ Sexe : M F

Adresse :

Tél :

N° sécurité sociale : Caisse : Mutuelle :

Médecin prescripteur :

Résultats : à poster à prendre au laboratoire Internet (si vous n'avez pas de code internet, veuillez contacter le laboratoire pour qu'il vous les transmette)

Date du prélèvement : Heure du prélèvement:

Préleveur :

Prélèvement de contrôle : Non oui (dossier du __ / __ / __)

Renseignements cliniques :

Localisation (préciser tous les sites atteints) :

Autres cas dans l'entourage (localisation/espèce identifiée) :

Ancienneté des lésions :

Patient immunodéprimé : Oui Non

Notion de voyage (récent) qui aurait précédé la lésion : Oui : destination : Non

Suspicion d'une mycose d'importation : Oui Non

Profession exercée :

Loisirs : Piscine Equitation Salle de sport

Contact avec animaux : Bovins Ovins Autres :

Traitement antifongique commencé (local ou général) :

Non Oui : quand : molécule :

Description des lésions :

<p>Lésion cutanée :</p> <input type="checkbox"/> Arrondie <input type="checkbox"/> Asymétrique <input type="checkbox"/> Qui s'étend <input type="checkbox"/> Dyschromique <input type="checkbox"/> Inflammatoire <input type="checkbox"/> Types Herpès circiné <input type="checkbox"/> Recherche de pityriasis versicolor Autres :	<p>Cuir chevelu :</p> <input type="checkbox"/> Lésion suppurée <input type="checkbox"/> Alopecie Si oui : <input type="checkbox"/> grandes plaques <input type="checkbox"/> petites plaques Autres :	<p>Ongles :</p> <input type="checkbox"/> Périonyxis <input type="checkbox"/> Leuconychies <input type="checkbox"/> Atteinte matricielle Autres :
---	---	--